

「サークリサ[®]皮下注」「サークリサ[®]点滴静注」 取り違え注意のお願い

抗CD38モノクローナル抗体



サークリサ[®]皮下注 1400mg

SARCLISA[®]
イサツキシマブ(遺伝子組換え)製剤

生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品 薬価基準未収載

：注意—医師等の処方箋により使用すること



抗CD38モノクローナル抗体



**サークリサ[®]点滴静注 100mg
500mg**

SARCLISA[®]
イサツキシマブ(遺伝子組換え)製剤

生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品 薬価基準収載

：注意—医師等の処方箋により使用すること

謹啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃は、弊社ならびに弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、サークリサ[®]皮下注1400mg [一般名：イサツキシマブ(遺伝子組換え)] が承認され、投与時間の短縮が可能になるなど、投与方法の選択肢が広がりました。「サークリサ皮下注」と「サークリサ点滴静注」は投与方法が異なるため、各製品の外箱やキャップ・ラベルの色等で識別できるようにしております。以下に相違点をまとめましたので、調製前にご確認いただき、薬剤の取り違え・誤投与に十分ご注意くださいますよう、お願いいたします。

今後ともより一層のご支援、ご厚情を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

2026年6月吉日

販売名	サークリサ [®] 皮下注1400mg	サークリサ [®] 点滴静注100mg サークリサ [®] 点滴静注500mg
有効成分	(1バイアル中) イサツキシマブ(遺伝子組換え) 1400mg/10mL (140mg/mL)	【サークリサ [®] 点滴静注100mg】 (1バイアル中) イサツキシマブ(遺伝子組換え) 100mg/5mL (20mg/mL) 【サークリサ [®] 点滴静注500mg】 (1バイアル中) イサツキシマブ(遺伝子組換え) 500mg/25mL (20mg/mL)
投与経路	専用の注水器 [†] 、又は手動投与用のシリンジと皮下投与セットを用いて腹部に皮下投与	点滴静注
用法及び用量	他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人にはイサツキシマブ(遺伝子組換え)として1回1400mgを、併用する抗悪性腫瘍剤の投与サイクルを考慮して、以下のA法又はB法の投与間隔で皮下投与する。 A法：1週間間隔、2週間間隔の順で投与する。 B法：1週間間隔、2週間間隔及び4週間間隔の順で投与する。	他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人にはイサツキシマブ(遺伝子組換え)として1回10mg/kgを、併用する抗悪性腫瘍剤の投与サイクルを考慮して、以下のA法又はB法の投与間隔で点滴静注する。 デキサメタゾンのみとの併用投与又は単独投与の場合(再発又は難治性の場合に限る)、通常、成人にはイサツキシマブ(遺伝子組換え)として1回20mg/kgを、以下のA法の投与間隔で点滴静注する。 A法：1週間間隔、2週間間隔の順で投与する。 B法：1週間間隔、2週間間隔及び4週間間隔の順で投与する。

[†] 専用の注水器は国内未承認

