

ÉVALUATION DES TROUBLES SEXUELS DANS LA SEP : MSISQ-19

(Multiple Sclerosis Intimacy and Sexuality Questionnaire-19)^{1,2,3}

40 À 80% DES PATIENTS SOUFFRANT DE SEP SONT ATTEINTS DE TROUBLES SEXUELS CLASSIFIÉS SELON TROIS TYPES :

- **LES DYSFONCTIONS SEXUELLES PRIMAIRES,**
liées aux atteintes neurologiques directes de la SEP
- **LES DYSFONCTIONS SEXUELLES SECONDAIRES,**
liées aux changements physiques non sexuels mais affectant la réponse sexuelle
- **LES DYSFONCTIONS SEXUELLES TERTIAIRES,**
liées aux valeurs psychosociales et culturelles, propres à chaque individu



**ÉVALUEZ
LES DYSFONCTIONS
SEXUELLES**

**DE VOTRE PATIENT EN VOUS
APPUYANT SUR
LE QUESTIONNAIRE
MSISQ-19**

PENDANT LES 6 MOIS PASSÉS, LES SYMPTÔMES SUIVANTS ONT AFFECTÉ L'ACTIVITÉ ET LE PLAISIR SEXUEL DE MON/MA PATIENT(E)...

	JAMAIS	PRESQUE JAMAIS	PARFOIS	PRESQUE TOUJOURS	TOUJOURS
	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

SCORE

- **DYSFONCTIONNEMENT SEXUEL PRIMAIRE** / Sujets = 12, 16, 17, 18, 19
- **DYSFONCTIONNEMENT SEXUEL SECONDAIRE** / Sujets = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11
- **DYSFONCTIONNEMENT SEXUEL TERTIAIRE** / Sujets = 7, 9, 13, 14, 15

↳ TOUTE PROPOSITION AYANT UN SCORE DE 4 OU 5 DEVRA FAIRE L'OBJET D'UNE DISCUSSION AVEC VOTRE PATIENT.