

Prévention

pour protéger les nourrissons¹

La vaccination contre la coqueluche chez le nourrisson est obligatoire et doit se faire à l'âge de 2, 4 et 11 mois*. Ce schéma ne doit pas être différé.

Recommandations du calendrier vaccinal en vigueur



Femme enceinte¹

Vaccination préconisée :
• A partir du 2^e trimestre de grossesse
• En privilégiant la période entre 20 et 36 semaines d'aménorrhée.

En cas d'absence de vaccination de la femme enceinte, la France préconise la vaccination du cocon familial susceptible d'être en contact étroit et durable avec le nourrisson.



Grands-parents



Baby-sitter

Entourage de la femme enceinte

Populations incluses dans la stratégie du cocooning¹



Jeunes parents



Fratrie avec grand écart d'âge¹



Nourrissons



Professionnels de santé & Professionnels de la petite enfance



Entourage de la femme enceinte

Durant ses 6 premiers mois de vie, le nouveau-né n'est pas protégé contre la coqueluche car son schéma vaccinal n'est pas complet.²

Demandez conseil
à votre professionnel de santé

Coqueluche

L'importance de protéger les nourrissons

sanofi

Sanofi-Pasteur Europe S.A.S. au capital de 88 200 000 000 € - R.C.S. Lyon B 821 177 425 - FRANI000004044 - MAT-FR-2000109 - Février 2022

* Elle est combinée à celle de la diphtérie, du tétanos, de la poliomyélite, de l'hépatite B et des infections invasives à *Haemophilus influenzae* de type B.
¹ Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales en vigueur.
² Vaccination Info Service - Les maladies et leurs vaccins. [En ligne, consulté le 12 avril 2022].
³ Santé Publique France. Dossier pédagogique - Vaccination : la protection collective. Octobre 2017.

Gravité

de la coqueluche potentielle chez les bébés, les femmes enceintes et les personnes âgées.¹



La coqueluche est l'une des 1^{res} causes de décès

par infection bactérienne chez les nourrissons entre 10 jours et deux mois de vie.²

La maladie se manifeste par une toux surnommée...

Le « Chant du coq »

devenant quinteuse, épuisante et répétée, de jour comme de nuit et durant plusieurs semaines. Ces quintes peuvent entraîner des vomissements.¹



HOSPITALISATION
systématique des
moins de 3 mois³

Transmission par un membre de la famille dans près de 9 cas sur 10¹

La coqueluche est la 2^e maladie **la plus contagieuse** après la **rougeole**.²

Contagiosité

Comment se transmet-elle ?

Principalement par les gouttelettes aériennes provoquées par la **toux**.³



1 personne atteinte de

COVID-19 en contamine

3⁴

COQUELUCHE en contamine

15⁵

¹ Vaccination Info Service - Les maladies et leurs vaccins [En ligne, consulté le 12 avril 2022].

² Floret D. Groupe de pathologie infectieuse pédiatrique, Groupe francophone de réanimation et urgence pédiatrique.

« Les décès par infection bactérienne communautaire. Enquête dans les services de réanimation pédiatrique français. » Arch Pédiatr 2001 ; 8 suppl 4 : 705-11

³ Inserm-Coqueluche, « la toux des 100 jours » est revenue [En ligne, consulté le 12 avril 2022].

¹ Santé Publique France. Principales caractéristiques des cas de coqueluche identifiés par le réseau Renacoq, 1996-2015. Disponible sur <https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/coqueluche/donnees> [consulté le 21 mars 2022]

² Santé sur le net - Rougeole, Ebola, grippe : quel virus est le plus contagieux [En ligne, consulté le 12 avril 2022].

³ Vaccination Info Service - Les maladies et leurs vaccins [En ligne, consulté le 12 avril 2022].

⁴ Gouvernement.fr. Info coronavirus. Comprendre la COVID-19. Mise à jour le 10 novembre 2021.

⁵ Cohen R et al. Pertussis vaccination coverage among French parents of infants after 10 years of cocoon strategy. Médecine et maladies infectieuses 46 (2016) 188-193.