


# LA COQUELUCHE



La **coqueluche** peut être une maladie **grave** chez les nourrissons, les femmes enceintes et les personnes âgées.<sup>1</sup>

**1** L'UNE DES  
ÈRES  
causes de décès  
par infection bactérienne chez  
les nourrissons entre 10 jours et  
deux mois de vie.<sup>2</sup>



Hospitalisation  
systématique des  
moins de 3 mois<sup>3</sup>

**2** ÈME  
maladie la plus  
contagieuse  
après la rougeole.<sup>4</sup>

**1** personne  
atteinte de  
coqueluche  
en contamine **15**<sup>5</sup>

Comment  
se transmet-elle ?



Principalement par les  
gouttelettes aériennes  
provoquées par la toux.<sup>1</sup>



La maladie se manifeste  
par une toux surnommée...  
**Le « Chant du coq »**  
devenant quinteuse, épuisante  
et répétée, de jour comme de nuit  
et durant plusieurs semaines.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Vaccination Info Service - Les maladies et leurs vaccins [En ligne, consulté le 10 juin 2022].

<sup>2</sup> Floret D. Groupe de pathologie infectieuse pédiatrique, Groupe francophone de réanimation et urgence pédiatrique. « Les décès par infection bactérienne communautaire. Enquête dans les services de réanimation pédiatrique français. » Arch Pédiatr 2001; 8 suppl 4 : 705-11

<sup>3</sup> Inserm - Coqueluche, « la toux des 100 jours » est revenue [En ligne, consulté le 10 juin 2022].

<sup>4</sup> Santé sur le net - Rougeole, Ebola, grippe : quel virus est le plus contagieux [En ligne, consulté le 10 juin 2022].

<sup>5</sup> Cohen R et al. Pertussis vaccination coverage among French parents of infants after 10 years of cocoon strategy. Médecine et maladies infectieuses 46 (2016) 188-193.

**sanofi**

Transmission  
par un membre de la  
famille dans près de  
**9 cas sur 10<sup>1</sup>**



L'importance  
de protéger les  
nourrissons contre  
la coqueluche

La HAS recommande la **vaccination des femmes enceintes** pendant la grossesse contre la **coqueluche** dans le but de prévenir la coqueluche chez les nouveau-nés et les très jeunes nourrissons avant leur schéma de primovaccination par le transfert transplacentaire d'anticorps maternels.

## LA VACCINATION DE LA FEMME ENCEINTE CONTRE LA COQUELUCHE

- Est recommandée dès le 2<sup>ème</sup> trimestre de grossesse, de préférence entre **20 et 36 semaines d'aménorrhée**
- Est recommandée à **chaque grossesse**
- **Peut protéger** les nouveau-nés pour **1 à 3 mois** contre la coqueluche<sup>2</sup>



**VÉRIFIER LE STATUT VACCINAL  
DE LA FEMME ENCEINTE AVANT DE  
VÉRIFIER CELUI DE L'ENTOURAGE**  
(stratégie du cocooning)<sup>3</sup>

La vaccination de l'entourage s'appliquera :

- En l'**absence de la vaccination contre la coqueluche** de la femme enceinte
- En cas de naissance moins d'un mois après la vaccination (ex : **naissance prématurée**)

<sup>1</sup> Santé Publique France. Principales caractéristiques des cas de coqueluche identifiés par le réseau Renacoq, 1996-2015. Disponible sur <https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/coqueluche/donnees> (consulté le 10 juin 2022).

<sup>2</sup> Haute Autorité de Santé. Recommandation vaccinale contre la coqueluche chez la femme enceinte. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2022.

<sup>3</sup> Calendrier des vaccinations et recommandations en vigueur.