





Rabbia, una malattia ancora trascurata



*Uccide 1 persona
ogni 9 minuti*
59.000 morti all'anno
in tutto il mondo¹



Trasmessa dal *morso o dal graffio*
di un animale rabbioso, *il 99% delle
volte da cani* ma anche da altri
animali selvatici e domestici¹



Provoca un'*infiammazione
cerebrale acuta* e può avere
forme furiose o paralitiche¹



Mortale quando
si manifestano
i sintomi¹

Ma si può prevenire *con la vaccinazione¹*

Vaccinazione preventiva



Posologia della PrEP con 2 dosi

Posologia della PrEP con 3 dosi

Profilassi pre-esposizione
(PrEP) = *2 o 3 dosi di vaccino**
nell'arco di 1-3 settimane

Dopo l'esposizione alla rabbia



Un *TEMPESTIVO* intervento
post-esposizione consente di
prevenire la malattia

Indipendentemente dall'essere precedentemente immunizzati o meno
contro la rabbia, **QUALSIASI** potenziale esposizione richiede
un'*immediata profilassi post-esposizione (PEP)* :



1 Lavare bene e a lungo la ferita




almeno
15 minuti

2

Vaccinazione


Posologia per soggetti già immunizzati
contro la rabbia (PEP= solo 2 dosi)



RIG NON
necessarie

1 iniezione per dose, indipendentemente
dalla via di somministrazione

Posologia per soggetti con ciclo vaccinale non completo
contro la rabbia (PEP= 3, 4 o 5 dosi*)



1 iniezione per dose tramite iniezione intramuscolare
2 iniezioni per dose tramite iniezione intradermica

La PrEP è raccomandata per le popolazioni ad alto rischio di esposizione

Popolazioni in contesti altamente endemici con accesso limitato a una PEP tempestiva e adeguata¹




Viaggiatori che potrebbero essere a rischio di esposizione¹



Soggetti esposti ad animali potenzialmente infetti (addetti ai laboratori, veterinari...)¹

Rischio di rabbia associato al viaggio

Incidenza dei morsi di animali nei viaggiatori = **0,4%/mese di permanenza²**



Tra i viaggiatori che svolgono attività a rischio solo **il 2-11%** ha percepito un rischio molto alto o elevato di esposizione alla rabbia e solo **l'8%** si è sottoposto alla vaccinazione PrEP³

La prevenzione contro la rabbia (PrEP) dovrebbe essere presa in considerazione prima di viaggiare in aree a rischio:

1

Perché *la PrEP per la rabbia è fortemente raccomandata da parte degli organismi sanitari (OMS, US-ACIP) ai viaggiatori internazionali in aree ad alto rischio^{1,4}, specialmente se impegnati in attività all'aperto in zone remote^{1,5}*

2

Poiché *l'accesso tempestivo alle cure (vaccino e RIG) non è garantito ovunque nel mondo⁶, il che potrebbe ritardare l'assistenza e comportare la fine prematura del viaggio*

LIVELLO DI RISCHIO DI CONTRARRE LA RABBIA per l'uomo*

● Nessun rischio


● Basso rischio

● Rischio moderato

● Rischio elevato

★ RIG non disponibili in tutto il Paese entro 48 ore

★ RIG e vaccini non disponibili in tutto il Paese entro 48 ore



* Dalla pubblicazione 'Viaggi internazionali e salute' -OMS. Distribuzione dei livelli di rischio per l'uomo di contrarre la rabbia, a livello mondiale, 2018⁷

Bibliografia

1. World Health Organization- WHO Position paper on rabies vaccines Apr 2018. 93 (16): 201-20. 2. Gautret P, et al. Rabies vaccination for international travelers. Vaccine, 2012. Vaccine 30: 126- 133. 3. Marano C, et al. Perceptions of rabies risk: a survey of travellers and travel clinics from Canada, Germany, Sweden and the UK. J Trav Med. 2019. 26 (Suppl 1): S3-S9. 4. US Centers for Disease Control and Prevention. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) recommendations. MMWR May 06, 2022. 71 (18):619-27. 5. World Health Organization. (2018). WHO expert consultation on rabies: third report. World Health Organization. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/272364>. 6. Henry RE, et al. A country classification system to inform rabies prevention guidelines and regulations. J Travel Med, 2022. 1-9. 7. Alhassan SA, et al. A Case of Fatal Rabies in a Donkey in Dawakin Tofa, Kano State, Nigeria. J. Anim. 2020. Health Prod. 8(1): 40-4.