



Manifestaciones cardíacas que pueden indicar inicio de TRE en la enfermedad de Fabry

PACIENTES CON FENOTIPO CLÁSICO DE ENFERMEDAD DE FABRY			PACIENTES CON FENOTIPO DE ENFERMEDAD DE FABRY DE APARICIÓN TARDÍA Y PACIENTES CON VARIANTES MISSENSE DE SIGNIFICADO INCIERTO
Paciente varón	Paciente mujer		
Sintomático o asintomático	Sintomático	Asintomático	Paciente varón y mujer
La TRE debe considerarse y es apropiada en todos los pacientes en cualquier edad de presentación	Se debe considerar la TRE y es apropiada si hay signos/síntomas que sugieren afectación de órganos importantes, como enfermedad cardíaca sintomática que NO se debe a otras causas: • Disnea • Palpitaciones • Síncope • Dolor en el pecho	Se debe considerar la TRE si hay evidencia de laboratorio, histológica o de imágenes de lesión en el corazón, como enfermedad cardíaca asintomática: • Miocardiopatía o arritmia • Fibrosis cardíaca en la resonancia magnética cardíaca con contraste	Signos/síntomas que sugieren afectación de órganos importantes, que justifican el inicio de la TRE, incluso en ausencia de síntomas típicos de enfermedad de Fabry, como enfermedad cardíaca asintomática NO atribuible a otras enfermedades: • Esto puede requerir evidencia histológica o bioquímica