

# MISMA INSULINA, AHORA EN DOS DISPOSITIVOS<sup>1</sup>



1 insulina - 2 plumas

## CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

**Toujeo® SoloStar®**

Insulina glargina 300 U/ml

**Toujeo® DoubleStar®**

Insulina glargina 300 U/ml



Mismo tamaño de la pluma<sup>1</sup>



Vida útil sin refrigeración: **6 semanas**<sup>1</sup>



Tiempo de presión tras inyección: **5 segundos**<sup>1</sup>

## DIFERENCIAS

**Toujeo® SoloStar®**

Insulina glargina 300 U/ml

**Toujeo® DoubleStar®**

Insulina glargina 300 U/ml



Ajuste de  
1 en 1 U<sup>1</sup>



Émbolo con la mitad  
de extensión<sup>1</sup>



Máx. 80 U  
por inyección<sup>1</sup>



Etiqueta y cartucho  
con colores diferentes



Contiene:<sup>1</sup>  
● 1,5 ml  
● 450 U



Ajuste de  
2 en 2 U<sup>1</sup>



Máx. 160 U  
por inyección<sup>1</sup>



Contiene:<sup>1</sup>  
● 3 ml  
● 900 U



Guía de uso



SANOFI 

# MISMA INSULINA, AHORA EN DOS DISPOSITIVOS<sup>1</sup>



## Características insulina Toujeo<sup>®</sup>



Administración **1 VEZ al DÍA**  
Por la mañana o por la noche



Mayor duración de acción



Flexibilidad de +/- 3 h. en la hora de administración\*, cuando se necesite

1. Ficha técnica Toujeo<sup>®</sup>

\*Cuando sea necesario, los pacientes pueden administrar Toujeo<sup>®</sup> hasta 3 horas antes o después de su hora habitual de administración (ver sección 5.1 de la ficha técnica de Toujeo<sup>®</sup>). Basado en 2 estudios clínicos aleatorizados y abiertos durante un período de 3 meses. Los pacientes adultos con DM2 (n = 194) recibieron Toujeo<sup>®</sup> una vez al día por la noche, ya se a la misma hora del día (hora fija de administración) o dentro de las 3 horas antes o después de la hora habitual de administración (hora de dosificación flexible). La administración con un tiempo de dosificación flexible no tuvo ningún efecto sobre el control glucémico y la incidencia de hipoglucemia.<sup>1</sup>