

# VACUNA TdPa



## INDICACIÓN

- Inmunización activa frente al tétanos, difteria y tos ferina en personas a partir de 4 años de edad como dosis de recuerdo tras la inmunización primaria.<sup>1</sup>
- La protección pasiva frente a tos ferina en la infancia más temprana después de la inmunización materna durante el embarazo.<sup>1</sup>



## POSOLOGÍA

- Se recomienda una única inyección de una dosis (0,5 ml) en todos los grupos de edad indicados.<sup>1</sup>
- Los individuos que no hayan recibido previamente la vacunación primaria completa con toxoides de difteria y tétanos no deben ser vacunados con Triaxis.<sup>1</sup>
- Se puede administrar en adolescentes y adultos con esquema de vacunación incompleto o desconocido frente a difteria o tétanos como parte del esquema de vacunación para proteger frente a la tos ferina y, en la mayoría de los casos, también frente al tétanos y la difteria.<sup>1</sup>
- Se puede utilizar como vacunación de recuerdo para reforzar la inmunidad frente a la difteria, tétanos y pertussis en intervalos de 5 a 10 años.<sup>1</sup>
- Se puede utilizar en el tratamiento de lesiones con riesgo de enfermedad del tétanos con o sin la administración concomitante de inmunoglobulina antitetánica de acuerdo con las recomendaciones oficiales.<sup>1</sup>
- Se puede administrar a mujeres embarazadas durante el segundo y tercer trimestre para proporcionar protección pasiva en los recién nacidos frente a pertussis.<sup>1</sup>



## COMPOSICIÓN

<b>Toxoide diftérico</b> .....	no menos de 2 UI* (2 Lf)
<b>Toxoide tetánico</b> .....	no menos de 20 UI* (5 Lf)
<b>Antígenos de pertussis</b>	
<b>Toxoide pertussis</b> .....	2,5 microgramos
<b>Hemaglutinina filamentosa</b> .....	5 microgramos
<b>Pertactina</b> .....	3 microgramos
<b>Fimbrias tipos 2 y 3</b> .....	5 microgramos
<b>Adsorbido en fosfato de aluminio</b> .....	1,5 mg (0,33 mg de Al <sup>3+</sup> ) <sup>1</sup>



## INMUNOGENICIDAD

- Niños de 4 a 6 años:** difteria y tétanos 100% y pertussis 88,1-94,6%.<sup>1</sup>
- Adolescentes de 11 a 17 años:** difteria 99,8%, tétanos 100% y pertussis 85,6-94,9%.<sup>1</sup>
- Adultos (18 a 64 años):** difteria 94,1%, tétanos 100% y pertussis 82,7-93,8%.<sup>1</sup>



## PRESENTACIÓN

1 jeringa precargada lista para usar con 1 dosis = 0,5 ml (Intramuscular).<sup>1</sup>



## COADMINISTRACIÓN

Gripe inactivada, Hepatitis B, poliomielitis inactivada u oral y recombinante VPH.<sup>1</sup>



## VOLUMEN DE CAJA

154 cc.



## ESTABILIDAD / PERIODO DE VALIDEZ

4 años.<sup>1</sup>

\*Como límite de confianza inferior (p = 0,95) de actividad medida según la prueba descrita en la Farmacopea Europea

## VER FICHA TÉCNICA