


# LA COQUELUCHE



**La coqueluche peut-être une maladie grave chez les nourrissons, la femme enceinte et les personnes âgées<sup>1</sup>**

**1** L'UNE DES  
**ÈRES**  
**causes de décès**  
par infection bactérienne chez les nourrissons entre 10 jours et deux mois de vie.<sup>2</sup>



**Hospitalisation**  
systématique des  
**moins de 3 mois<sup>3</sup>**

**2** ÈME maladie la  
**plus**  
**contagieuse**  
après la rougeole<sup>4</sup>

**1** personne  
atteinte de  
**coqueluche**  
en contamine **15<sup>5</sup>**

**Comment  
se transmet-elle ?**



**Principalement par les  
gouttelettes aériennes  
provoquées par la  
toux.<sup>1</sup>**



**La maladie se manifeste  
par une toux surnommée...  
Le « Chant du coq »**

devenant quinteuse, épuisante et répétée, de jour comme de nuit et durant plusieurs semaines.<sup>1</sup>

1. Vaccination info service. La coqueluche. Disponible sur: <https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Coqueluche>

2. Floret D. Groupe de pathologie infectieuse pédiatrique, Groupe francophone de réanimation et urgence pédiatrique. « Les décès par infection bactérienne communautaire. Enquête dans les services de réanimation pédiatrique français. » Arch Pédiatr 2001 ; 8 suppl 4 : 705-11

3. Inserm. La coqueluche. Disponible sur : <https://www.inserm.fr/dossier/coqueluche/>

4. Santé sur le net. Rougeole. Disponible sur: [https://www.bing.com/search?q=sant%C3%A9+sur+le+net+rougeole&cid=988c3cc7736443ef9554828b150b341b&gs\\_lcrp=EgRIZGdlKgYIABBFgDkyBggAEEUYOTIGCAEQABhAMgYIAHAAAGEAyBggDEAAyQDIGCAQQA](https://www.bing.com/search?q=sant%C3%A9+sur+le+net+rougeole&cid=988c3cc7736443ef9554828b150b341b&gs_lcrp=EgRIZGdlKgYIABBFgDkyBggAEEUYOTIGCAEQABhAMgYIAHAAAGEAyBggDEAAyQDIGCAQQA)

5. Cohen R et al. Pertussis vaccination coverage among French parents of infants after 10 years of cocoon strategy. Médecine et maladies infectieuses 46 (2016) 188-193.

Transmission  
par un membre de la  
famille dans près de

**9 cas sur 10<sup>1</sup>**



L'importance de  
protéger les  
nourrissons contre  
la coqueluche

La HAS recommande la **vaccination des femmes enceintes** pendant la grossesse contre la **coqueluche** dans le but de prévenir la coqueluche chez les nouveau-nés et les très jeunes nourrissons avant leur schéma de primovaccination par le transfert transplacentaire d'anticorps maternels.<sup>2</sup>

## LA VACCINATION DE LA FEMME ENCEINTE CONTRE LA COQUELUCHE

- Est recommandée dès le 2<sup>ème</sup> trimestre de grossesse, de préférence entre **20 et 36 semaines d'aménorrhée**
- Est recommandée à **chaque grossesse**
- **Peut protéger** les nouveau-nés **pour 1 à 3 mois** contre la coqueluche<sup>2</sup>



**VÉRIFIER LE STATUT VACCINAL  
DE LA FEMME ENCEINTE AVANT DE  
VÉRIFIER CELUI DE L'ENTOURAGE**  
(stratégie du cocooning)<sup>4</sup>

La vaccination de l'entourage s'appliquera :

- En l'**absence de la vaccination contre la coqueluche** de la femme enceinte
- En cas de naissance moins d'un mois après la vaccination (ex : **naissance prématurée**)

1. Santé Publique France. La coqueluche disponible sur <https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/coqueluche>

2. Kilgore, P. E., Salim, A. M., Zervos, M. J., & Schmitt, H. J. (2016). Pertussis: Microbiology, Disease, Treatment, and Prevention. *Clinical microbiology reviews*, 29(3), 449–486. <https://doi.org/10.1128/CMR.00083-15>

3. Haute Autorité de Santé - Recommandation vaccinale contre la coqueluche chez la femme enceinte. Disponible sur: [https://www.has-sante.fr/jcms/p\\_3084228/fr/recommandation-vaccinale-contre-la-coqueluche-chez-la-femme-enceinte](https://www.has-sante.fr/jcms/p_3084228/fr/recommandation-vaccinale-contre-la-coqueluche-chez-la-femme-enceinte)

4. Calendrier des vaccinations. Disponible sur: <https://sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal>