

EoE = Eosinophile Ösophagitis; **TCS** = topische Kortikosteroide.

* DUPIXENT® ist angezeigt zur Behandlung der Eosinophilen Ösophagitis bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 1 Jahr mit einem Körpergewicht von mindestens 15 kg, die mit einer konventionellen medikamentösen Therapie unzureichend therapiert sind, diese nicht vertragen oder für die eine solche Therapie nicht in Betracht kommt.² | # Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde auf die gleichzeitige Verwendung geschlechtsspezifischer Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten aber selbstverständlich für alle Geschlechter. | a In einer Studie zum Remissionserhalt erreichten in Woche 48 73,5 % der EoE-Patienten[#] unter Budesonid 2x 0,5 mg, 75 % der Patienten unter Budesonid 2x 1 mg und 4,4 % der Placebo-Patienten den primären Endpunkt des Remissionserhalts. Dieser war definiert als Patienten, die keines der folgenden Kriterien erfüllten: klinisches Rezidiv, histologisches Rezidiv, endoskopische Intervention aufgrund von Bolusimpaktation, Bedarf einer Dilatation oder vorzeitiger Abbruch der Studienteilnahme aus jedwedem Grund.¹

1. Straumann A *et al. Gastroenterology* 2020; 159(5): 1672–1685.e5;
2. DUPIXENT® Fachinformationen, aktueller Stand; 3. Dellon ES *et al. N Engl J Med* 2022; 387(25): 2317–2330; inkl. Supplementary Material;
4. Rothenberg ME *et al. Lancet Gastroenterol Hepatol* 2023; 8(11): 990–1004; inkl. Appendix.

MAT-DE-2404463-1.0-11/2024