

**EoE** = Eosinophile Ösophagitis; **IL** = Interleukin.

\* DUPIXENT® ist angezeigt zur Behandlung der Eosinophilen Ösophagitis bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 1 Jahr mit einem Körpergewicht von mindestens 15 kg, die mit einer konventionellen medikamentösen Therapie unzureichend therapiert sind, diese nicht vertragen oder für die eine solche Therapie nicht in Betracht kommt.<sup>2</sup> | # Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde auf die gleichzeitige Verwendung geschlechtsspezifischer Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten aber selbstverständlich für alle Geschlechter. | a IL-4 und IL-13 sind Treiber der Typ-2-Inflammation.<sup>6,7</sup> Dupilumab bindet an die Alpha-Untereinheit des Interleukin(IL)-4-Rezeptors, wodurch die Signalwege von IL-4 und IL-13 gehemmt werden.<sup>2</sup>

**1.** Chehade M *et al.* Vortrag *Cross-Sectional Real-World Survey of Adult Patients with Eosinophilic Oesophagitis: Symptom Burden and Adaptive Behaviours* präsentiert auf dem Kongress der European Academy of Allergy & Clinical Immunology (EAACI) 2025; Glasgow, Vereinigtes Königreich; 13.–16. Juni 2025; **2.** DUPIXENT® Fachinformationen, aktueller Stand; **3.** Dellon ES *et al.* *N Engl J Med* 2022; 387(25): 2317–2330; inkl. Supplementary Material; **4.** Rothenberg ME *et al.* *Lancet Gastroenterol Hepatol* 2023; 8(11): 990–1004; inkl. Appendix; **5.** Chehade M *et al.* *N Engl J Med* 2024; 390(24): 2239–2251; inkl. Supplementary Material; **6.** Gandhi NA *et al.* *Nat Rev Drug Discov* 2016; 15(1): 35–50; **7.** Gandhi NA *et al.* *Expert Rev Clin Immunol* 2017; 13(5): 425–437.