

# RED FLAGS EoE:

## REGOLE DI BUONA PRATICA CLINICA PER IL PERCORSO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO

### RED FLAGS

- COMPORTAMENTI ADATTATIVI
- SINTOMI DIFFERENTI IN BASE ALL'ETÀ E SOVRAPPONIBILI A QUELLI DI ALTRE PATOLOGIE GASTRICHE
- COMORBIDITÀ TYPE 2i

- VARIABILITÀ INTER E INTRA OPERATORE
- MANCATO RICONOSCIMENTO DELLE LESIONI ENDOSCOPICHE DELLA EoE
- MANCATO OTTENIMENTO DEI CAMPIONI BIOPTICI ADEGUATI

- VARIABILITÀ NEL VALORE EOS/HPF
- MANCATO ESAME ISTOLOGICO PER VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISPOSTA AI TRATTAMENTI
- SINTOMI NON CORRELATI AL GRADO DI EOSINOFILIA

### VALUTAZIONE CLINICA



- AVVALERSI DEL DSQ SCORE PER VALUTAZIONE DISFAGIA
- DISTINGUERE EoE DA ALTRE PATOLOGIE GASTRICHE
- PENSARE ALL'EoE IN PRESENZA DI COMORBIDITÀ TYPE 2i
- SOTTOPORRE DOMANDE PER IDENTIFICARE POSSIBILI COMPORTAMENTI ADATTATIVI

### VALUTAZIONE ENDOSCOPICA



- AVVALERSI DELL'EREFS SCORE PER VALUTAZIONE ENDOSCOPICA
- EFFETTUARE ALMENO 2 BIOPSIE SIA A LIVELLO PROSSIMALE SIA DISTALE DELL'ESOFAGO
- EFFETTUARE BIOPSIE INDIPENDENTEMENTE DALL'ASPETTO ENDOSCOPICO

### VALUTAZIONE ISTOLOGICA



- AVVALERSI DELL'HSS SCORE
- UTILIZZARE EOS/HPF PER VALUTARE LA RISPOSTA AI TRATTAMENTI
- UTILIZZARE EOS/HPF SU BIOPSIA ESOFAGEA PER CONFERMARE LA DIAGNOSI

<7 EOS/HPF REMISSIONE ISTOLOGICA COMPLETA  
 ≥7 ≤6 EOS/HPF REMISSIONE ISTOLOGICA  
 >6 <15 EOS/HPF RISPOSTA ISTOLOGICA  
 ≥15 EOS/HPF ASSENZA DI RISPOSTA

≥15 EOS/HPF:  
 DIAGNOSI DI EoE