

Manual bàsic de la campanya de vacunació de la grip 2022-2023

Protocol d'actuació

Versió	Data	Autoria	Aprovació
2	26/10/2022	Direcció General de Salut Pública i Participació	26/10/2022

A aquest manual s'inclouen les consideracions bàsiques de salut pública d'aplicació a la campanya de vacunació de la grip 2022-2023. Per informació més detallada de la campanya consultar el manual complet.

Contingut

1. Introducció.....	3
2. Població diana.....	3
3. Objectiu.....	5
4. Període de vacunació.....	5
5. Vaccins.....	6
5.1 Tipus de vaccins.....	6
5.2 Composició de la vacuna.....	6
5.3 Dosificació i vies d'administració.....	7
5.4 Contraindicacions, efectes adversos i precaucions.....	7
6. Registre.....	10
7. Gestió dels vaccins.....	10
7.1 Distribució.....	10
7.2 Conservació i transport.....	11
7.3 Indicadors.....	11
7.4 Aspecte de les vacunes.....	13
7.5 Sol·licitud de vaccins suplementaris.....	14
7.6 Albarans.....	16
7.7 Centres amb visita de la Intervenció de la Conselleria d'Hisenda.....	17
7.8 Notificació d'incidències.....	18
8. Indicadors.....	18

1. Introducció

La vacunació antigripal és l'eina més potent per minimitzar l'impacte de la grip en morbimortalitat i va dirigida als grups de població amb major risc de patir formes greus de la malaltia.

La campanya es dirigeix a totes les persones a partir dels 60 anys i les menors de 60 anys que compleixen algun dels criteris d'inclusió del programa, és a dir, que tenen alguna de les condicions de risc establertes.

Durant la campanya 2022-2023 s'ha previst dur a terme una vacunació conjunta de COVID amb grip amb l'objectiu principal d'assolir un elevat nivell de cobertura en tots els col·lectius de risc d'ambdues vacunes tenint en compte les exclusions de vacunació de COVID-19 i els grups vacunació conjunta definits.

2. Població diana

Els grups inclosos per a la campanya actual a les Illes Balears són els que es detallen a continuació:

1. Persones de 60 anys d'edat o més: cal posar esment especialment en les persones que conviuen en institucions tancades.
2. Persones de menys de 60 anys amb condicions clíniques que impliquen un alt risc de patir complicacions derivades de la grip o que els pot provocar una descompensació de la condició mèdica:
 - Infants de sis mesos o més i adults amb malalties cròniques cardiovasculars, neurològiques o respiratòries, incloses la displàsia broncopulmonar, la fibrosi quística i l'asma.
 - Infants a partir dels sis mesos d'edat i adults amb:
 - Diabetis *mellitus*.
 - Obesitat mòrbida (índex de massa corporal ≥ 40 en adults, ≥ 35 en adolescents, ≥ 3 desviacions estàndard en la infantesa).
 - Malaltia renal crònica i síndrome nefròtica.
 - Hemoglobinopaties i anèmies.
 - Hemofília, altres trastorns de la coagulació i trastorns hemorràgics crònics. Receptors d'hemoderivats i transfusions múltiples.
 - Asplènia o disfunció esplènica greu.
 - Malaltia hepàtica crònica. Inclou alcoholisme crònic.
 - Malalties neuromusculars greus.

- Immunosupressió. Inclou immunodeficiències primàries i la immunosupressió originada per infecció del VIH o per fàrmacs (incloses les persones tractades amb eculizumab), les receptores de trasplantaments i les que presenten dèficit de complement.
- Càncer i hemopaties malignes.
- Implant coclear (realitzat o en espera).
- Fístula de líquid cefaloraquídi.
- Malaltia celíaca.
- Malaltia inflamatòria crònica (inclou malalties reumàtiques i autoimmunes).
- Trastorns o malalties que comporten disfunció cognitiva (síndrome de Down, demències i d'altres).

En aquest grup cal posar esment especial en les persones que necessitin un seguiment mèdic periòdic o que hagin estat hospitalitzades durant l'any passat.

- Infants i adolescents (de 6 mesos a 18 anys) que rebin algun tractament prolongat amb àcid acetilsalicílic, atesa la possibilitat de desenvolupar la síndrome de Reye després de la grip.
- Dones embarassades en qualsevol moment de gestació. Les no vacunades durant l'embaràs s'han de vacunar en el puerperi fins als 6 mesos.
- Infants de 6 a 24 mesos amb antecedents de prematuritat menor de 32 setmanes de gestació.
- Persones de qualsevol edat (de 6 mesos o més) institucionalitzades de forma permanent o perllongada.

3. Persones que poden transmetre la grip a altres que tenen un risc alt de presentar complicacions:

- Treballadors dels centres sanitaris, tant de l'atenció primària com de l'atenció especialitzada i hospitalària (pública o privada), així com personal d'oficines de farmàcia i centres sociosanitaris. S'ha de posar esment especial en els professionals que atenen pacients d'alguns dels grups d'alt risc descrits abans.
- Persones que treballen en institucions geriàtriques o a centres d'atenció a malalts crònics, especialment les que tinguin contacte continu amb persones vulnerables.
- Estudiants en pràctiques a centres sanitaris i sociosanitaris.
- Persones que proporcionin cures domiciliàries a pacients de risc alt o a ancians (definitos als apartats 1 i 2)
- Persones que convisquin -inclosos els infants- amb d'altres que pertanyin a algun dels grups d'alt risc, per la seva condició clínica especial (vegeu el punt 2)

4. Altres grups als quals es recomana la vacunació:

- Persones que treballen a serveis públics essencials, amb èmfasi especial en els subgrups següents:

- Forces i cossos de seguretat dependents de l'Estat, amb dependència nacional, autonòmica o local.
- Bombers.
- Serveis de protecció civil.
- Persones que treballen als serveis d'emergències sanitàries.
- Treballadors d'institucions penitenciàries i d'altres centres d'internament per resolució judicial. Inclou els centres d'acollida d'immigrants.
- Treballadors exposats directament a aus o a porcs en granges o explotacions avícoles o porcines i també a aus silvestres. La finalitat és reduir l'oportunitat d'una infecció concomitant de virus humans i aviaris o porcins i, d'aquesta manera, disminuir la possibilitat de recombinació o intercanvi genètic entre els virus.
- Treballadors de les escoles de zero a cinc anys, tant docents com cuidadors

El nombre de persones amb criteris d'inclusió es calcula a partir de la població reconeguda oficialment pel Servei de Salut de les Illes Balears. D'acord amb les dades registrades a 30 de setembre de 2022 a les Illes Balears es troben registrades 1.205.302 persones de les quals es considera que aproximadament un terç compleixen els criteris d'inclusió la qual cosa dona una població objectiu teòrica de **457.473 persones**.

3. Objectiu

S'han de vacunar totes les persones de 60 anys i més i les menors de 60 anys que compleixen els criteris d'inclusió establerts en el programa.

Objectius de cobertura:

- Majors de de 60 anys (posant especial atenció a persones que viuen a residències) i personal sanitari i sociosanitari: **75%**
- Resta de col·lectius: **60%**

4. Període de vacunació

Entre el dia 13 d'octubre i el 1 de desembre. A partir del dia 1 de desembre s'obrirà la vacunació a grups no inclosos als objectius de vacunació prioritari.

5. Vaccins

5.1 Tipus de vaccins

Enguany la compra de dosis suplementàries pel Ministeri possibilitarà una millor cobertura i, en el cas de persones majors institucionalitzades, una millor protecció. Les indicacions s'han fet en relació a les dosis disponibles de cadascuna de les vacunes que només seran dues.

Marca i laboratori	Tipus de vacuna	Població a qui va destinada
Efluelda (Sanofi Aventis)	Inactivada tetravalent d'alta càrrega antigènica	Persones institucionalitzades de 65 anys i més.
Vaxigrip Tetra® (Sanofi Aventis)	Inactivada tetravalent	Resta població objecte de vacunació

5.2 Composició de la vacuna

Composició antigènica de la vacuna antigripal recomanada per l'Organització Mundial de la Salut per a la temporada 2022-2023, segons el nombre de components de les vacunes emprades a les Illes Balears.

Origen	Component	Soques temporada 2022-2023 <i>[soca 2022-2023]</i>
Ou embrionat	A(H1N1)	A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 <i>[No hi ha canvis]</i>
	A(H3N2)	A/Darwin/9/2021 (H3N2) <i>[A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)]</i>
	B Victoria	B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria) <i>[B/Washington/02/2019]</i>
	B Yamagata <i>Component addicional vacuna tetravalent</i>	B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata) <i>[No hi ha canvis]</i>

5.3 Dosificació i vies d'administració

Vaxigrip Tetra® ▼

Es pot administrar per les vies intramuscular i subcutània.

Edat	Dosi	Nombre de dosis	Via i lloc d'injecció
6-35 mesos	0,5 ml	- 1 dosi si s'ha vacunat anteriorment. - 2 dosis separades per quatre setmanes si és la primera vegada.	Intramuscular a la cara anterolateral d'una cuixa
3-8 anys	0,5 ml	- 1 dosi si s'ha vacunat anteriorment. - 2 dosis separades per quatre setmanes si és la primera vegada que es vacuna.	Intramuscular Zona deltoide
8 anys i més	0,5 ml	- 1 sola dosi.	Intramuscular Zona deltoide

Efluelda®

Edat	Dosi	Nombre de dosis	Via i lloc d'injecció
65 o més anys	0,7 ml	- 1 dosi	Intramuscular. Zona deltoide.

- **Cap de les vacunes** s'ha d'administrar per la via intravascular, en cap circumstància.
- **Persones amb alteracions de la coagulació:** vegeu les indicacions a l'apartat "Precaucions".

5.4 Contraindicacions, efectes adversos i precaucions

- **Efluelda®**
 - No indicada a menors de 65 anys.
 - Hipersensibilitat a qualsevol principi actiu o excipient de la vacuna. Podeu consultar la fitxa tècnica de la vacuna al següent enllaç:
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/85068/FT_85068.pdf
- **Vaxigrip Tetra®** :
 - No indicada a menors de sis mesos.
 - Hipersensibilitat a qualsevol principi actiu o excipient de la vacuna. Podeu consultar la fitxa tècnica de la vacuna al següent enllaç:
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/81098/FT_81098.pdf

Efectes adversos

- Els efectes adversos inclouen reaccions locals, cefalees, artràlgies i sudoració, i també quadres de febre amb malestar i miàlgies, però la majoria solen desaparèixer al cap de dos o tres dies sense que s'hagin de tractar.
- Altres reaccions adverses més rares: consulteu les fitxes tècniques de cada producte (vegeu els annexos corresponents).
- Anafilaxi (molt rara): s'han descrit casos d'anafilaxi després de l'administració de la vacuna de la grip. Cal disposar sempre de medicació adequada per tractar una possible reacció anafilàctica. Si apareix la reacció, s'ha de fer una valoració ràpida de la permeabilitat de la via aèria i de la funció cardiorespiratòria i administrar adrenalina i oxigen si cal.
- **Notificació d'efectes adversos:** és obligatori notificar les sospites de reacció adversa dels medicaments autoritzats (RD 1344/2007, de farmacovigilància). A més a més, són medicaments amb l'advertència de triangle negre invertit (▼), amb la qual cosa estan subjectes a seguiment addicional. Les notificacions s'han d'enviar el més aviat possible al Centre Autonòmic de Farmacovigilància per mitjà del formulari oficial, més conegut com a «targeta groga», que està a disposició de tots els professionals sanitaris als llocs següents:
 - A la Història clínica electrònica d'Atenció Primària (e-SIAP): icona de la targeta groga.
 - A la icona de la targeta groga a l'aplicació de Recepta Electrònica.
 - Al web del Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris també està disponible la targeta groga, que es pot emplenar directament en línia des de la pagina web <http://controldelmedicament.caib.es>.
 - Al web de la Coordinació de Vacunes: <http://vacunes.caib.es>.

Registrar:

- **La identificació del pacient.**
- **La identificació de la vacuna: marca i lot. El lot s'ha d'emplenar sempre.**
- **La reacció o reaccions observades, de la forma més acurada possible.**

Precaucions

- Infants de 6 a 35 mesos amb antecedents de convulsions febrils: consulteu amb l'equip de pediatria.
- La vacuna antigripal es pot administrar de manera concomitant amb altres vacunes, tot i que les reaccions adverses es poden intensificar. Cada vacuna s'ha d'aplicar en una extremitat diferent o a una distància mínima entre elles de 3 cm.
- En pacients febrils o amb infecció aguda s'ha d'ajornar l'administració de la vacuna.

- Una reacció anafilàctica a una dosi prèvia d'una vacuna o a algun component d'aquesta és una contraindicació permanent per tornar a administrar aquesta vacuna o qualsevol altra vacuna que contengui el component en qüestió.
- Les persones amb història d'al·lèrgia a l'ou es poden vacunar normalment, tot i que convé vigilar el període posterior a l'administració de la vacuna.
- Embaràs i lactància: Vaxigrip Tetra es pot administrar en totes les fases de l'embaràs i durant la lactància.
- Pacients immunodeprimits: l'administració de la vacuna no hi està contraindicada.
- No cal determinació de l'INR a les persones en **tractament amb anticoagulants o amb trastorns de la coagulació** ni fer un control especial posterior. La via recomanada és la intramuscular, ja que la subcutània no s'acompanya d'una resposta immune adequada i sí de major reactogenicitat. En canvi, la intramuscular és segura i mostra eficàcia. Seguint el procediment adequat minva el risc de sagnar :
 - S'ha d'emprar una agulla de calibre 23 G com a màxim. El risc de sagnar s'associa més amb el gruix de l'agulla que amb la longitud d'aquesta. Es poden fer servir agulles de calibre 25 G (0,5 mm, de 16 o 25 mm de longitud) o de 23 G (0,6 mm, de 25 mm de longitud), d'acord amb l'edat i lloc anatòmic on calgui administrar la vacuna. En cap cas no farem servir agulles de calibre 21 G (0,8 mm, de 16 o 40 mm de longitud).
 - Després de l'administració s'ha de fer una pressió ferma sobre la zona de punció (NO fregar, NO fer massatge) al manco dos minuts per afavorir l'hemostàsia. Sempre s'ha de considerar la possibilitat d'aparició d'un hematoma en la zona d'injecció.
 - En el cas de pacients hemofílics, la vacunació s'ha d'administrar el més ràpidament possible després de rebre la teràpia substitutiva amb factors de coagulació.

Administració simultània amb altres vacunes: Hi ha evidència que **es pot administrar juntament amb la vacuna contra la COVID-19** sense que augmenti les reaccions adverses ni disminueixi la resposta immunitària. En aquest cas, com en qualsevol altra vacunació concomitant, s'han d'administrar a membres diferents i, si no és possible, a una distància mínima de 3 cm entre les dues vacunes. També es pot administrar amb altres vacunes com la del Pneumococ.

6.Registre

- **Els centres de salut d'Atenció Primària del Servei de Salut** han de registrar les vacunacions a través de l'aplicació corresponent.

S'han de registrar les vacunacions efectuades a l'aplicació e-SIAP. Per evitar oblits i acumulació de feina (que sempre indueix a més errors dels habituals) s'han de registrar immediatament si es fan al centre, mentre que els que es facin a fora dels centres (essencialment domicilis) s'han de registrar sempre que sigui possible el mateix dia i, en qualsevol cas, intentar que no s'acumulin.

En cas que la persona vacunada no estigui d'alta a la base de dades s'ha de donar d'alta a CIVITAS, inclosos els casos d'assistència privada.

- **Centres de vacunació sense accés a l'aplicació d'Atenció Primària** (Residències, serveis de prevenció de risc laboral i altres centres) han de registrar a l'aplicació de la Conselleria:
 - **Aplicació VACUNA, mòdul CAMPANYES.**

Accés on line.

S'ha de demanar l'alta a vacunaciogrip@caib.es amb les dades següents: Institució, nom complet, llinatges, DNI, professió (Medicina o Infermeria), número de col·legiat, correu electrònic, telèfon de contacte.

<https://www.caib.es/sites/vacunacions/ca/grip-84862/>

7.Gestió dels vaccins

7.1 Distribució

Durant la campanya 2022-2023 s'ha previst adquirir un màxim de 300.000 dosis de Vaxigrip Tetra® i 4.800 dosis de Fluzone HD Quadrivalent®. A data d'inici de la campanya ja s'han adquirit la totalitat de les dosis de Fluzone HD Quadrivalent® i 162.056 dosis de Vaxigrip Tetra®.

Els punts de distribució dels diferents vaccins són els següents:

- Vaxigrip Tetra® (Sanofi Aventis):
 - Tots els centres de vacunació.
- Fluzone HD Quadrivalent® (Sanofi Aventis):

- Residències amb persones institucionalitzades de 65 i més anys, en una sola entrega al principi de la campanya.

7.2 Conservació i transport

Les vacunes s'han de conservar entre 2 °C i 8 °C i cal evitar que es congelin. És necessari, doncs, comprovar que es mantenen els nivells tèrmics de la gelera.

- Per transportar les vacunes cal emprar geleres portàtils proveïdes d'acumuladors de fred congelats que ocupin aproximadament un terç del volum de la gelera i que cobreixin l'interior de les parets. Durant el transport s'han de protegir de la llum i garantir que no es superen els 22°C
- Per evitar la congelació s'ha d'impedir el contacte directe de les vacunes amb els acumuladors.
- **Si les vacunes arriben en mal estat** (sense indicador de temperatura, amb l'indicador sense activar, amb l'indicador virat, etc.), la persona responsable de la vacunació ha de contactar amb una de les infermeres responsables de vacunes dels responsables de Vacunes de Salut Pública de l'illa corresponent.
- Conservació al centre:
 - Comproveu que totes les neveres tenen termòmetre.
 - Conserveu entre 2 °C i 8 °C.
 - Eviteu que es congelin.
 - Reviseu i registreu diàriament les temperatures.
 - Conserveu-les dins els envasos (unidosi o multidosis).

Podeu consultar les recomanacions de conservació al web <http://vacunes.caib.es>.

7.3 Indicadors

S'utilitza l'indicador de temps-temperatura i de congelació per transportar les dues vacunes.

a) Temps – temperatura:


Hi ha d'haver un indicador dins cada caixa, 3M Monitor Mark:

- És una targeta amb una llengüeta a l'extrem esquerre per activar l'indicador i cinc finestres numerades que es tenyeixen de blau de manera gradual i irreversible si les vacunes han estat exposades a temperatures superiors a 10 °C. El nombre de finestres tenyides de color es relaciona amb el temps d'exposició a les temperatures altes de manera directa.
- Si la llengüeta d'activació no s'ha retirat de l'extrem esquerre, 3M Monitor Mark no està activat, i per això cal posar-se en contacte amb els responsables de la tramesa. Si totes les finestretes (1, 2, 3, 4 i 5) apareixen completament blanques, el producte es pot emprar.



Manteniment correcte de la temperatura màxima

- Si 3M Monitor Mark presenta una coloració blava a la finestra 2 o a les posteriors, la vacuna podria haver estat afectada per temperatures superiors a 10 °C. Aleshores cal guardar les vacunes dins la gelera i contactar amb els responsables de la tramesa.



VERD: sense alarma.

VERMELL: alarma. Guardeu les vacunes dins la gelera i contacteu amb els responsables de la tramesa (Conselleria de l'illa corresponent).

b) Congelació

Hi ha d'haver un indicador dins una caixa de cada 5 o fracció que arribin al centre.

7.4 Aspecte de les vacunes

Abans d'administrar la vacuna:

- Tempereu-la a temperatura ambient.
- Agiteu-la amb suavitat.
- Comproveu-ne l'aspecte

VAXIGRIP TETRA



EFLUELDA



S'ha de rebutjar si presenta:

- Partícules en suspensió.
- Suspensió **blanca-lletosa amb** partícules alienes o variació de color.
- Suspensió transparent o lleugerament opalescent amb partícules alienes o variació de color.

7.5 Sol·licitud de vaccins suplementaris

En cas de necessitat de dosis s'ha previst un segona entrega de vacunes que es durà a terme prèvia sol·licitud dels centres vacunadors.

<i>Illa</i>	<i>Centre</i>	<i>Fax</i>	<i>Telèfon</i>	<i>Correu electrònic</i>
Mallorca, Atenció Primària	Son Pisà (CS /UBS/ PVM)			catalina.bonet@ibsalut.es
	HUSE		680 483 309 971 28 38 26	sebastian.jaume@ibsalut.es
Mallorca, altres centres i serveis de vacunació.	D.G. de Salut Pública, Vacunes		971 17 66 20	vacunaciogrip@dgsanita.caib.es
Menorca	Centre Insular de Menorca	971 17 69 14	971 17 73 33	vacunesmenorca@dgsanita.caib.es
Eivissa	Centre Insular d'Eivissa i Formentera	971 17 68 61	971 17 70 67	vacuneseivissa@dgsanita.caib.es

Canvis de vacuna entre centres:

No s'han de fer canvis entre centres, sinó que s'han de demanar a la Conselleria.

Si per alguna circumstància excepcional és necessari demanar una vacuna a un altre centre, el centre que cedeix la vacuna ho ha de comunicar a la Conselleria. La vacuna no s'ha de retornar al centre que l'ha cedida

Els models de sol·licitud de la vacuna són a les pàgines següents.

ATENCIÓ PRIMÀRIA IB-SALUT

CS/UBS*:

Tel.:

** Només unitats bàsiques que poden sol·licitar vacunes (vegeu el directori).*

Sol·licitant (nom i llinatges):

Adreça electrònica:

Data de la sol·licitud:

ALTRES

Centre:

Tel.:

Sol·licitant (nom i llinatges):

Adreça electrònica:

Data de la sol·licitud:

<i>Vacuna</i>	<i>Quantitat</i>
VAXIGRIP®	

7.6 Albarans

RECEPCIÓ:

El control d'albarans és una tasca **fonamental** de la persona responsable de la vacunació antigripal, que haurà de dur a terme les següents funcions:

1. Efectuar la recepció de les dosis.
2. Cercar l'albarà de les VAG (pot estar dins el paquet amb les agulles o bé aferrat a la capsa). S'ha d'assegurar que és l'albarà del laboratori farmacèutic (necessari per a la posterior facturació) i no el full del transportista.

L'albarà SEMPRE du el nom del laboratori i el nombre de dosis, tal com es veu a la imatge:

sanofi-aventis, S.A.
Josep Pla, nº 2
08019 - BARCELONA
Teléfono: +34 93 485 94 00 Fax: +34 93 485 95 00
C.I.F.: ESA08163586

SANOFI

ALBARÁN DE EXPEDICIÓN

Datos comerciales		de fecha		Datos Entrega		Cuenta.	
Nº Albarán:	5001432688	28.08.2020	28.08.2020	09641085	100031001	C.I.F. S0711001H	
S/ Pedido:	E-MAIL	28.08.2020	28.08.2020				

Datos expedición

Envío por: INTEGRAL 2 FRIOFARMA
Medio Transporte: Via area
Nº de bultos: 00060 Peso (kg): 165,000
Volumen CM3: 3.222.400,000 Peso Neto(kg): 115,000

 Centre que rep les vacunes

Código	Descripción/Lote	Fecha caducidad	% IVA	Unidades	Precio	Importe	Nota
716924	VXG_QUADRID ES PR WE (715222) Lote: T3J012V	31-07-2020	d	300	9,50	2.850,00	870,00

Nombre de dosis

3. Comprovar la quantitat de dosis rebudes, el lot, la data de caducitat, i la temperatura.
4. Consignar les dosis rebudes i la temperatura a l'albarà.
5. Consignar la data i l'hora de recepció de la comanda. Això és especialment important si es reben comandes fora dels horaris establerts.
6. Consignar el centre i el nom i llinatges de la persona que fa la recepció.
7. Signar l'albarà.
8. En cas de rebre una entrega sense albarà, s'ha de avisar immediatament la Coordinació de Vacunes de la DGSP, al telèfon 971 17 73 34 - 971 17 73 32.

TRAMESA DE L'ALBARÀ (PER A TOTES LES ILLES):

Coordinació Vacunes de les Illes Balears de la DGSP, per fax o mail:

- Fax **971 17 69 98**
- Mail **vacunaciogrip@caib.es**

7.7 Centres amb visita de la Intervenció de la Conselleria d'Hisenda

Cada any, per assegurar un bon control del compliment dels contractes, es fa una visita de recompte de dosis rebudes a una mostra dels centres de vacunació.

La Conselleria comunica als responsables dels centres que s'han de visitar que han estat seleccionats i la data.

Per facilitar el recompte i interferir el manco possible en la feina del centre, sempre que es pugui s'han de mantenir les vacunes dins les capsas i el manco disperses possible dins els centres.

Si és necessari l'ús de dosis de vacuna abans de la visita de recompte, la persona responsable de la campanya al centre ha d'emetre un document que ho certifiqui, segons el model.

CERTIFICAT d'ús de dosis abans de la visita de la Intervenció de la Conselleria d'Hisenda
Nom i llinatges:
Càrrec (infermer/a, metge/ssa, director/a...):
CENTRE:
CERTIFICA:
Que en aquest centre s'han rebut totes les dosis de vacuna de grip corresponents a la primera entrega, realitzada el mes de novembre de 2022.
Que per atendre les necessitats de la població se n'han distribuït..... dosis, abans de efectuar-se l'acte formal de recepció del subministrament.
<u>DOSIS</u>
- Dosis albarà de la 1a entrega
- Dosis distribuïdes abans de l'acte de recepció
- Dosis estoc actual
....., de de 20...

7.8 Notificació d'incidències

SEMPRE s'han de comunicar les incidències a la Conselleria, al contacte de l'illa corresponent, amb independència que des dels centres de salut es puguin comunicar també a la seva gerència o, des d'altres centres, als seus superiors.

Això inclou sol·licituds extraordinàries de vacuna.

8. Indicadors

MENORS DE 14 ANYS
Núm. total de vaccinats < 14 anys
Núm. total de vaccinats amb criteri d'inclusió < 14 anys
Cobertura de vacunació antigripal en persones < 14 anys
ENTRE 14 I 59 ANYS
Núm. total de vaccinats entre 14 i 59 anys
Núm. total de vaccinats amb criteri d'inclusió entre 14 i 59 anys
Cobertura de vacunació antigripal en persones de 14 a 59 anys
MAJORS DE 60 ANYS
Núm. total de vaccinats >=60 anys
Cobertura de vacunació antigripal en persones >= 60 anys
TOTAL
Núm. total de vaccinats

Per donar resposta als indicadors del ministeri, les cobertures de vacunació pels majors de 60 anys es proporcionaran desagregades per les següents categories.

ENTRE 60 I 64 ANYS
Núm. total de vaccinats entre 60 i 64 anys
Cobertura de vacunació antigripal en persones de 60 a 64 anys
ENTRE 65 I 74 ANYS
Núm. total de vaccinats entre 65 i 74 anys
Cobertura de vacunació antigripal en persones de 65 i 74 anys
MAJORS DE 75 ANYS
Núm. total de vaccinats >=75 anys
Cobertura de vacunació antigripal en persones >= 60 anys

Les cobertures també es proporcionaran per les diferents condicions de risc.